



Kirk A. Coury, DDS, MS • James C. Douthitt, DDS, MS

10 Care Circle, Suite A • Amarillo, Texas 79124

806.354.2424 • 1.866.593.ENDO • Fax 806.354.9479 • www.amarilloendo.com

MICROSURGICAL ROOT CANAL TREATMENT (instructions available at www.amarilloendo.com)

1. Swelling, minor pain, oozing of blood, and/or bruising of the skin around the surgical site may be experienced. This is temporary. If the surgery was performed in the lower jaw, a tingling of the lower lip is possible due to stretching of the nerve supply in this area. In rare cases, numbness may be present for several days, weeks, or months.
2. To keep swelling to a minimum, use of an ice pack on the face over the operated area is recommended. The ice should be used in an alternating fashion, 20 minutes on, 20 minutes off, for 4-6 hours following surgery.
3. Do not raise the lip with your fingers to inspect the treated area; you may pull out the sutures.
4. Avoid hot liquids and eat only soft foods for the first 24-48 hours. Use your own judgement after this period, but avoid hard foods for 1 week.
5. Do not brush your teeth near the operated area for 5 days following surgery. Be sure to brush the rest of your teeth. Dip a Q-tip in your mouth rinse (peridex) and rub over the teeth in the surgical site.
6. Starting tomorrow, rinse twice daily with a capful of Peridex. In addition, begin to rinse your mouth with salt water (1 teaspoon of salt to a cup of comfortably hot water). Do this 4-5 times a day, soaking the area for 1 minute each time. Continue for 3-5 days postoperatively.
7. Get plenty of rest and nourishment. Avoid alcohol and tobacco, especially during the first 24 hrs after surgery.
8. Discomfort is normal. 2-3 ibuprofen or prescribed medication every 4-6 hours for 3 days following surgery will help minimize the discomfort. Should you require additional pain relief, add an extra-strength Tylenol to the ibuprofen.
9. Should you have any questions or concerns, do not hesitate to call the office, any time, including nights and weekends.

806.354.2424



Kirk A. Coury, DDS, MS • James C. Douthitt, DDS, MS

10 Care Circle, Suite A • Amarillo, Texas 79124

806.354.2424 • 1.866.593.ENDO • Fax 806.354.9479 • www.amarilloendo.com

TRATAMIENTO MICROQUIRÚRGICO DE LOS CONDUCTOS RADICULARES

1. Se puede experimentar hinchazón, dolor menor, exudado de sangre y/o hematomas de la piel alrededor del sitio quirúrgico. Esto es temporal. Si la cirugía se realizó en la mandíbula inferior, es posible sentir un hormigueo en el labio inferior debido al estiramiento del suministro nervioso en esta área. En casos raros, el adormecimiento del área puede estar presente por varios días, semanas o meses.
2. Para mantener la hinchazón al mínimo, se recomienda el uso de un paquete de hielo en la cara sobre el área operada. El hielo debe usarse de manera alterna, 20 minutos puesto y 20 minutos fuera, durante 4-6 horas después de la cirugía.
3. No levante el labio con los dedos para inspeccionar el área tratada; puede sacar las suturas.
4. Evite los líquidos calientes y coma solamente alimentos blandos durante las primeras 24-48 horas. Use su propio juicio después de este periodo, pero evite los alimentos duros durante 1 semana.
5. No cepille los dientes cerca del área operada durante 5 días después de la cirugía. Asegúrese de cepillarte el resto de los dientes. Sumerja un Q-Tip en su enjuague bucal (Peridex) y frote los dientes cuidadosamente en el sitio quirúrgico.
6. A partir de mañana, enjuague dos veces al día con una tapa del Peridex. Además, comience a enjuagar la boca con agua salada (1 cucharadita de sal en una taza de agua cómodamente caliente). Haga esto 4-5 veces al día, empapando el área por 1 minuto cada vez. Continúe por 3-5 días postoperatoriamente.
7. Descanse abundantemente y nutriéndose. Evite el alcohol y el tabaco, especialmente durante las primeras 24 horas después de la cirugía.
8. Molestia es normal, 2-3 ibuprofeno o medicación prescrita cada 4-6 horas durante 3 días después de la cirugía ayudará a minimizar el malestar. Si necesita aliviar el dolor adicional, añada un Tylenol de fuerza extra al ibuprofeno.
9. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, no dude en llamar a la oficina, en cualquier momento, incluyendo noches y fines de semana.

806.354.2424